

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kehadiran kumbang scarabidae yang paling banyak jenis di tangkap adalah *Ontophagus shirakii*.
2. Dari hasil penelitian jumlah penangkapan dari tiap-tiap umpan daging ikan 66 jenis individu, kotoran puyuh 19 jenis individu dan kotoran sapi 10 jenis individu
3. jumlah keseluruhan 9 jenis scarabaeidae dan 99 individu. Dari 9 jenis yang di tanggap, jenis *Ontophagus shirakii* yang paling banyak dengan jumlah 43 jumlah jenis individu yang tertangkap.

6.2 Saran

- a. Jika ingin melakukan penangkapan kumbang scarabaeidae maka gunakanlah umpan daging ikan, karena yang paling efektif di gunakan adalah jenis umpan daging ikan.
- b. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai studi keanekaragaman jenis kumbang (*Scarabaeidae*) pada tempat dan lokasi yang sama serta penelitian lainnya guna menunjang hasil penelitian ini seperti vegetasi, kesuburan tanah, dan lain-lainnya sehingga penelitian tersebut memberikan hasil yang memuaskan.